Pad-Test-Protokoll

uro aktiv
die urologen
im diako das ärztehaus

Volker Moll
Facharzt für Urologie
Med. Tumortherapie
Männergesundheit cmi

Achim Martus
Facharzt für Urologie
Andrologie

Kooperierende Praxis der LMU München

Belegärzte im diako die stadtklinik

Verbund Interdisziplinäre ambulant-stationäre Versorgung Augsburg e.V.

Patient:

Sehr geehrte Patientin,
sehr geehrter Patient,

Sie wurden von uns gebeten wegen einer Harninkontinenz einen sogenannten **Pad-Test** durchzuführen. Hierbei möchten wir genau ermitteln, wie viel Urin Sie verlieren. Bitte verwenden Sie hierzu immer die gleiche Windelsorte und ermitteln Sie mit der Küchenwaage das Leergewicht der Windel. Dann wiegen Sie an zwei Tagen über jeweils 24 Stunden jede gewechselte Windel, ziehen das Leergewicht ab und notieren die Differenz in der Tabelle unter „Windel“. Bei Bedarf können Sie in der gleichen Tabelle auch die Urinmengen eintragen, die Sie normal lassen (hierzu erhalten Sie ggf. einen Messbecher).

Beginn am: ___ . ___ . 20 ____

Uhrzeit	Trinken	Urin	Drang*	Windel*

Beginn am: ___ . ___ . 20 ____

Uhrzeit	Trinken	Urin	Drang*	Windel*

*Drang: 0 – kein | 1 – gering | 2 – normal | 3 – stark

*Windel: Windelgewicht minus Leergewicht

© uro aktiv 10/2011 [FB_PT.dot]